

Provisionalização imediata de um incisivo central

Arturo Llobell
Espanha



Arturo Llobell

Paciente

Mulher de 40 anos

Situação clínica

Tratamento endodôntico falhado de um incisivo central

Solução cirúrgica

Leito de extração, colocação imediata de implante NobelActive® TiUltra™, enxerto ósseo reduzido com creos™ xenogain, pilar SnapTemp

Solução protética

Coroa em zircónia com faceta de cerâmica em camadas apenas no aspeto bucal

Data da cirurgia

Abril de 2019

Tempo total de tratamento


3 meses

Posição dos dentes

11

Teve de ser extraído um incisivo central perdido. Foi colocado imediatamente um implante NobelActive® TiUltra™ com pilar SnapTemp e provisionalização imediata.

Resultado clínico 5 meses após a colocação do implante apresenta tecidos moles e duros estáveis e saudáveis.



Situação clínica inicial

Procedimento cirúrgico

Procedimento protético

Resultado



Situação clínica inicial.

Radiografia e CBCT apresentam tratamento endodôntico e protético falhado. A paciente recusou opções de tratamento ortodôntico de erupção forçada.

Situação clínica inicial

Procedimento cirúrgico

Procedimento protético

Resultado



Saída de sangue juntamente com as roscas da superfície hidrofílica do TiUltra™ durante a colocação do implante.

Colocação imediata do implante NobelActive® TiUltra™ 3.5 x 13 mm num alvéolo pós-extracional recente.

Situação clínica inicial




Preservação óssea com creos™ xenogain.

Procedimento cirúrgico



Pilar SnapTemp colocado.

Procedimento protético




Polimerização da resina durante a provisionalização temporária.

Situação clínica inicial

Procedimento cirúrgico

Procedimento protético

Resultado



Provisórios temporários colocados no dia da cirurgia.

Radiografia no dia da cirurgia.

Situação clínica inicial

Procedimento cirúrgico

Procedimento protético

Resultado




Coifa de impressão personalizada.

Situação clínica inicial

Procedimento cirúrgico

Procedimento protético

Resultado




Impressão final com a coifa de impressão personalizada de forma a traduzir o perfil de emergência para a futura restauração protética definitiva.

Situação clínica inicial

Procedimento cirúrgico

Procedimento protético

Resultado



Situação clínica 5 meses após a colocação do implante.

Radiografia no seguimento aos 5 meses.

Caso gentilmente cedido pelo Sr. Arturo Llobell

